

تم تحميل وعرض هذا الماده من موقع واجبي:



www.wajibi.net

اشترك معنا ليطلع كل جديد:



الفصل الأول: مقدمة في علم الكيمياء

الدرس 1-1 (قصة مادتين)

الفكرة الرئيسية: الكيمياء هي دراسة المادة و التغيرات التي تطرأ عليها **المادة:** هي كل شيء له كتلة و يشغل حيزا .

ماذا تدرس الكيمياء ؟

تدرس المادة والتغيرات التي تطرأ عليها. وتتوفر دراستها الكثير من الراحة والرفاهية للناس

طبقة الأوزون

إن التعرض الزائد للأشعة فوق البنفسجية UV مؤذٍ للحيوانات والنباتات.

UVB - أحد أنواع الأشعة فوق البنفسجية- يمكن أن تسبب إعتاماً في العين و سرطاناً في الجلد عند الإنسان وتقلل من نواتج المحاصيل الزراعية وتسبب خللاً في سلاسل الغذاء في الطبيعة.

الغلاف الجوي للأرض

المادة الكيميائية: لها تركيب محدد و ثابت و تسمى بالمادة الندية

طبقة الاستراتوسفير تمتد بين KM 10-50 فوق سطح الأرض وفيها طبقة الأوزون التي تحمي الأرض وهي تمتص معظم الأشعة الكونية قبل ان تصل الي الأرض .

قياسات دوبسون

- تفاصيل كمية غاز الأوزون الموجودة في طبقة الاستراتوسفير عن طريق أجهزة موجودة على الأرض أو عن طريق بالونات أو أقمار صناعية أو صواريخ ولقد ساعدت قياسات دوبسون العلماء على تقدير كمية غاز الأوزون التي يجب أن توجد في الجو .

- **قياسات دوبسون/ هي (DU) 300 دوبسون في المعدل الطبيعي**


- **ما هو ثقب الأوزون ؟**

- سمك طبقة الأوزون في تناقص .

- تقلص ثقب الأوزون يسمى عادة "ثقب الأوزون" إلا أنه ليس ثقباً .

ت تكون الأوزون

- عندما يتعرض غاز الأكسجين للأشعة فوق البنفسجية UV تتحلل جزيئاته O_2 إلى ذرات أكسجين منفردة O وهي تتفاعل بدورها مع جزيئات غاز الأكسجين O_2 ليكون الأوزون O_3 .
- وكذلك يمكن لغاز الأوزون O_3 أن يمتص الأشعة فوق البنفسجية UV ليتحلل منتجًا غاز الأكسجين O_2 .
- ولذلك يحدث التوازن بين غازي الأكسجين والأوزون في طبقة الاستراتوسفير.



مركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs)

حضر العالم توماس ميجلي أول مركب من مركبات الكلوروفلوروكربون ، التي يرمز إليها CFCs وهي مادة مكونة من كلور و فلور و كربون ، وهي غير سامة ، لأنها لا تتفاعل مباشرة مع المواد الأخرى . من استعمالاتها : - أجهزة التكيف المنزلية - الثلاجات - تصنيع البوليمرات - دفع الرذاذ من علب الرش .

الدرس (1-2) الكيمياء والمادة

الفكرة الرئيسية : تتناول مجالات علم الكيمياء دراسة الأنواع المختلفة من المادة .

الكتلة : هي مقياس كمية المادة.

الوزن : ليس مقياساً لكمية المادة فحسب، وإنما هو أيضاً مقياس لقوة جذب الأرض للمادة.

نماذج

تهدف الكيمياء إلى تفسير الأحداث التي لا ترى بالعين . والتي ينتج عنها تغيرات ملحوظة. وتعد النماذج إحدى الطرائق لتوضيح ذلك.

النموذج : تفسير مرئي أو لفظي أو رياضي للبيانات التجريبية.

ومن أمثلتها ما يستعمل في : - في البناء - النموذج الحاسوبي للطائرة

- نماذج مختلفة لتمثيل المادة .

بعض فروع الكيمياء

بعض فروع الكيمياء		الجدول 1-1
الفرع	المادة	مجال الدراسة
الكيمياء العضوية	المواد التي تحتوي على كربون عموماً	الأدوية، والبلاستيك
الكيمياء غير العضوية	المواد التي لا تحتوي على كربون عموماً	المعادن، والفلزات واللافازات، وأشباه الموصفات
الكيمياء الفيزيائية	سلوك المادة وتغيراتها وتغيرات الطاقة المصاحبة لها	سرعة التفاعلات، وأآلية التفاعلات
الكيمياء التحليلية	أنواع المواد ومكوناتها	الأغذية، وتبسيط جودة المنتجات
الكيمياء الحيوية	المادة والعمليات الحيوية في المخلوقات الحية	التمثيل الغذائي، والتفسير
الكيمياء البيئية	المادة والبيئة	التلوث، والدورات الكيميائية الحيوية
الكيمياء الصناعية	العمليات الكيميائية في الصناعة	الأصباغ، ومواد الطعام
كيمياء البليمرات	المبلمرات والمواد البلاستيكية	الأنسجة، ومواد الطعام، والبلاستيك
الكيمياء الذرية	نظريات تركيب المادة	الروابط، وأشكال المدارات، والأطياف الجزيئية والذرية، والتركيب الإلكتروني
الكيمياء الحرارية	الحرارة الناتجة عن العمليات الكيميائية	حرارة التفاعل

الكيمياء علم أساسى

علم الكيمياء هو دراسة المادة والتغيرات التي تطرأ عليها .

الخلاصة

- النماذج أدوات يستعملها العلماء ومنهم الكيمائيون لتفسير الأحداث التي لا ترى بالعين المجردة
- الملاحظات التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة للمادة تعكس سلوك الذرات التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة .

الدرس (3-1) الطائق العلمية

الفكرة الرئيسية : يتبع العلماء الطريقة العلمية لطرح اسئلة واقتراح اجابات لها واختبارها ، وتقديم نتائج الاختبارات

الطريقة العلمية : طريقة منظمة تستعمل في الدراسات العلمية
الملاحظة

تبدأ الدراسة العلمية عادة بـ **الملاحظة** بسيطة . والـ **الملاحظة عملية جمع معلومات**.

بيانات نوعية : (معلومات تصف اللون او الرائحة او الشكل او بعض الخواص الفيزيائية الاخرى) وعموما أي شيء متصل بالحواس الخمس هو نوعي .
درجة الحرارة ، الضغط ، الحجم ، او كمية المادة الناتجة عن التفاعل ،

بيانات كمية : هي المعلومات الرقمية .

الفرضية

اكتشف الكيميائيان مولينا ورولاند وجود مركبات الكلوروفلوروكربيون قبل أن تبين البيانات الكمية تناقض مستوى غاز الأوزون في الاستراتوسفير .

- **افتراض مولينا ورولاند فرضيتان هما :**

١- أن مركبات CFCs تتحلل نتيجة التفاعل مع الأشعة فوق البنفسجية الآتية من الشمس .

٢- تقول إن الكلور الناتج عن هذا التفاعل يحطم جزيئات غاز الأوزون .

الفرضية عبارة عن تفسير مؤقت لظاهرة ما او حدث تمت ملاحظته وهو قابل للاختبار .

التجربة : المشاهدات المضبوطة التي تختبر الفرضية .

ان ملح الطعام يذوب في الماء الساخن اسرع من ذوبانه في الماء الذي درجة حرارته تساوي درجة حرارة الغرفة (20 سليزيوس) .

ولأن درجة الحرارة هي المتغير الذي تخطط لتغييره فهي **متغير مستقل** ،

وتسمى سرعة الذوبان **متغيرتابع** لأن قيمتها تتغير تبعاً للتغير المتغير المستقل .


من المهم وجود **ضابط** للمقارنة في كثير من التجارب .

الاستنتاج : حكم قائم على المعلومات التي يتم الحصول عليها .

نموذج مولينا ورولاند يبيّن تحطم الأوزون :

- الأشعة فوق البنفسجية تجعل الكلور Cl ينفصل عن مركب CCl_3F .
- الكلور يحطّم غاز الأوزون O_3 بالاتحاد معه لتكوين غاز الأكسجين O_2 ، وأول أكسيد الكلور ClO .
- تتحد ذرة الأكسجين O مع أول أكسيد الكلور ClO ليكون جزءاً من الأكسجين O_2 والكلور Cl ،
- ثم يتحد الكلور الحر Cl مرة أخرى مع جزء من غاز الأوزون O_3 وتتكرر العملية.

حسب الشكل التالي



النظرية والقانون العلمي

النظرية : تفسير لظاهرة طبيعية بناءً على مشاهدات واستقصاءات مع مرور الزمن .

أمثلة/ نظرية أينشتاين النسبية. نظرية دالتون الذرية ، النظرية الذرية الحديثة .

قانون علمي يصف علاقة أوجدها الله في الطبيعة تدعمها عدة تجارب.

أمثلة/ قانون نيوتن ، قوانين الغازات مثل قانون شارل .

الدرس (1-4) البحث العلمي

الفكرة الرئيسية: بعض البحوث العلمية تؤدي إلى تطوير تقنيات يمكن أن تحسن حياتنا والعالم من حولنا .

ـ **البحث النظري:** بحث يجرى للحصول على المعرفة من أجل المعرفة نفسها.

ـ **البحث التطبيقي:** بحث يجرى لحل مشكلة محددة .

ـ اكتشافات غير مقصودة

ألكسندر فلمنج اكتشف فطر البنسلين ، (البنسلين) سبب قتل البكتيريا.

جولييان هيل اكتشف النایلون . يستخدم النايلون بكثرة في صناعة ، الأنسجة ، بعض أنواع البلاستيك ، أشرطة التثبيت .

السلامة في المختبر راجع الجدول 1-2 الكتاب صفحة 29

ـ **وتستمر القصة:** إن مركبات CFCs ليست وحدها التي تتفاعل مع غاز الأوزون ، هناك بعض المواد الأخرى التي تتفاعل معه أيضًا فرابع كلوريد الكربون ، وميثيل الكلوروформ وبعض المواد التي تحتوي على بروم كلها تفكك غاز الأوزون .

مياثاق مونتريال

إنهاء استعمال هذه المركبات ، ووضع قيود لها .

ـ العوامل التي تسبب تكون ثقب الأوزون

● يتكون ثقب الأوزون سنويًا فوق القارة المتجمدة الجنوبية في فصل الربيع .

● وتتكون غيوم جليدية في طبقة الاستراتوسفير فوق هذه القارة عندما تنخفض درجات الحرارة هناك إلى (- 78 سليزيوس) وهذه الغيوم تحدث تغييرات تساعد على إنتاج كلور و بروم نشطين كيميائياً .

● وعندما تبدأ درجة الحرارة في الارتفاع في الربيع يبدأ هذان العنصرين النشطين في التفاعل مع غاز الأوزون مسببين تناقصه ، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث ثقب في الأوزون فوق القارة المتجمدة الجنوبية .

● كما يحدث تناقص لغاز الأوزون فوق القطب الشمالي ، لكن درجة الحرارة لا تبقى منخفضة مدة كافية هناك ، مما يعني تناقصا أقل في غاز الأوزون عند القطب الشمالي.

ـ فوائد الكيمياء

يعد الكيميائيون جزءاً من العلماء الذين يحلون الكثير من المشكلات والقضايا

ومن ذلك: - مشكلة تأكل الأوزون . اكتشاف بعض الأدوية ولقاحات الأمراض ومنها الأيدز والإإنفلونزا .

الفصل الثاني: المادة - الخواص والتغيرات

الدرس (1-2) خواص المادة

المواد الكيميائية النوية

عرفت إن المادة هي كل ما له كتلة ويشغل حيزا ، وإن كل شيء من حولنا مادة .

حالات المادة

المادة الصلبة / حالة من حالات المادة لها شكل وحجم محددان ، جزيئاتها متراصة ومتصلة وقويا تجاذب جزيئاتها قوية .

البلازمـا / وهي حالة مميزة من حالات المادة يمكن وصفها بأنها غاز متأين تكون فيه الإلكترونات حرقة وغير مرتبطة بذرة او جزيء .

السائل / حالة من حالات المادة له صفة الجريان حجمه ثابت ولكنه يأخذ شكل الوعاء الذي يوضع فيه ، وهو السائل غير قابل للانضغاط .

الغاز / حالة من حالات المادة حيث يأخذ الغاز شكل الإناء وحجمه ، جسيمات الغاز متباينة جداً بعضها عن بعض ، ولذلك جزيئات الغازات تنضغط بسهولة .

ما الفرق بين الغاز والبخار؟

غاز تشير إلى مادة توجد في الحالة الغازية في درجات الحرارة العادية .

أما كلمة **بخار** فتشير إلى حالة غازية لمادة توجد بشكل صلب أو سائل في درجات الحرارة العادية .

- بخار الماء يسمى بخارا لأن الماء يوجد بشكل سائل في درجات الحرارة العادية .

الخواص الفيزيائية للمادة

الخاصية الفيزيائية خاصية يمكن ملاحظتها او قياسها دون التغيير في تركيب العينة وتعد الكثافة و اللون والرائحة و القساوة و درجة الانصهار و درجة الغليان من الخواص الفيزيائية

الخواص غير المميزة هي التي تعتمد على كمية المادة الموجودة ومنها الكتلة و الطول والحجم.

الخواص المميزة / التي لا تعتمد على كمية المادة الموجودة ومنها الكثافة و درجة الانصهار و درجة الغليان .

الخواص الكيميائية للمادة

الخاصية الكيميائية وتسمى قدرة مادة ما على على الاتحاد مع غيرها أو التحول إلى مادة أخرى ، ومن أمثلتها الحديد عندما يصدأ .

ملاحظة خواص المواد

لكل مادة خواصها الفيزيائية والكيميائية المميزة لها .
ويبيّن الجدول التالي خواص النحاس .

خواص النحاس	الجدول 2-2
خواص كيميائية	خواص فيزيائية
يكون مركب كربونات النحاس الأاخضر عندما يتعرض للهواء الرطب.	بني محمر، لامع
يكون مواد جديدة عندما يتحد مع حمض النيترิก وحمض الكبريتيك.	قابل للسحب والطرق
يكون محلولاً شديداً للزرقة عندما يتفاعل مع الأمونيا.	موصل جيد للحرارة والكهرباء
	الكتافة = 8.92 g/cm^3
	درجة الانصهار = 1085°C
	درجة الغليان = 2570°C

خواص المواد وحالاتها

من الضروري تحديد الظروف ومنها الضغط ودرجة الحرارة – التي يتم خلالها ملاحظة خواص المادة ، لأن كلًا من **الخواص الفيزيائية والكيميائية** تعتمد على هذه الظروف .

الدرس (2-2) تغيرات المادة

التغيرات الفيزيائية

التغير الفيزيائي هو التغير الذي يحدث دون أن يغير تركيب المادة . ومن ذلك تقطيع الورق و كسر لوح زجاجي وتقطيع قماش وسحق مكعب سكر . تغير الحالة هو تحول المادة من حالة أخرى .

التغيرات الكيميائية

التغير الكيميائي هو العملية التي تتضمن تغيير مادة أو أكثر إلى مواد جديدة ، ويشار عادة إليه بالتفاعل الكيميائي .

تسمى المواد التي يبدأ بها التفاعل ((المتفاعلات))

أما المواد الجديدة المكونة فتسمى ((النواتج))

- وتشير المصطلحات التالية : تحلل ، انفجار ، صدأ ، تأكسد ، تأكل ، فقدان البريق ، تخمر ، احتراق ، تعفن إلى حدوث تفاعل كيميائي .

دلائل حدوث التفاعل الكيميائي

تغير اللون والمظهر . - تصاعد أبخرة . - تغير درجة الحرارة - حدوث فوران .

- من أمثلة تلك التغيرات الكيميائية التي يحدث نتيجتها تفاعلات كيميائية تعفن الفواكه ، فساد الأطعمة ، صدأ الحديد وغيرها .

قانون حفظ الكتلة

قانون حفظ الكتلة / وهو ينص على أن الكتلة لا تتفنى ولا تستحدث في أثناء التفاعل الكيميائي إلا بقدرة الله تعالى - أي أنها محفوظة بمعنى أن كتلة النواتج تساوي كتلة المتفاعلات .

قانون حفظ الكتلة

$$\text{كتلة المتفاعلات} = \text{كتلة النواتج}$$

كان الكيميائي الفرنسي أنتوني لافوازيه أول من استعمل الميزان الحساس في التفاعلات الكيميائية .

2-3 المخلوط

المخلوط

المخلوط / مزيج مكون من مادتين نقيتين أو أكثر مع احتفاظ كل من هذه المواد بخواصها الأصلية .

المخلوط غير المتجانس / مخلوط لا تمتزج فيه المواد بل تبقى المواد فيه متمايزة بعضها عن بعض وتركيبه غير منتظم لأن المواد فيه لم تمتزج تماماً وبقيت متمايزة .
ومن الأمثلة/ سلطة الخضار ، الماء والزيت .

المخلوط المتجانس / مخلوط له تركيب ثابت وتمتزج مكوناته بانتظام .
مثل **السبائك** وهي مخلوط متجانس من الفلزات أو من فلز ولافلز يكون فيه الفلز المكون الأساسي.



فصل المخلوط

الترشيح/ طريقة يستعمل فيها حاجز مسامي لفصل المادة الصلبة عن السائلة

الكروماتوجرافيا / (التحليل الاستشرابي) طريقة لفصل مكونات المخلوط (الطور المتحرك)
بالاعتماد على قابلية الاتجذاب كل مكون من مكونات المخلوط لسطح مادة أخرى (الطور الثابت). غالباً الطور المتحرك مادة غازية أو سائلة ، والطور الثابت مادة صلبة مثل ورق الكروماتوجرافيا.

التقطير / يمكن فصل معظم المخلوط عن طريق (التقطير)
طريقة لفصل المواد اعتماداً على اختلاف درجات غليانها .

التسامي / طريقة للفصل تؤدي للحصول على على مادة نقية صلبة من محلولها .

التسامي / وهو عملية تتحول فيها المادة الصلبة إلى غاز دون أن تنصهر أي دون أن تمر بالحالة السائلة.

٤-٢ العناصر والمركبات

العناصر

العنصر هو مادة كيميائية نقية لا يمكن تجزئتها إلى أجزاء أصغر منها بطرائق فيزيائية أو كيميائية .

الجدول الدوري / ينظم الجدول الدوري العناصر في شبكة تسمى الصفوف الأفقية فيها ، الدورات ، وتسمى الأعمدة المجموعات أو العائلات .

المركبات

كثير من المواد الكيميائية النقية تصنف على أنها مركبات .

المركب مادة تتكون من عنصرين مختلفين أو أكثر متeddin كيميائيا ، إنّ معرفة الرموز الكيميائية للعناصر تسهل كتابة صيغ المركبات الكيميائية NaCl ، H_2O .

فصل المركبات إلى مكوناتها:

لا يمكن تجزئة العناصر إلى مواد أبسط منها بطرائق فيزيائية أو كيميائية لكن يمكن تجزئة المركبات إلى مواد أبسط بطرائق كيميائية ، ولكي تفك هذه المركبات إلى عناصر فإنها تحتاج إلى طاقة كالحرارة و الكهرباء .

- (التحليل الكهربائي) يقوم التيار الكهربائي في هذه العملية بتحليل الماء إلى غازي الهيدروجين والأكسجين .

خواص المركبات:

تختلف خواص المركبات عن خواص العناصر الداخلة في تركيبها ويمكن تصنيف المواد إلى مواد نقية (عناصر أو مركبات) أو مخاليط .

قانون النسب الثابتة :

قانون ينص على أن المركب يتكون دائماً من العناصر نفسها بنسب كتالية ثابتة ويمكن التعبير عن الكميات النسبية بالنسبة المئوية بالكتلة .

النسبة المئوية بالكتلة / التعبير عن الكميات النسبية للعناصر في مركب ما ونسبة كتلة المركب تساوي مجموع كتل العناصر المكونة له .

$$\text{النسبة المئوية بالكتلة} (\%) = \frac{\text{كتلة العنصر}}{\text{كتلة المركب}} \times 100$$

قانون النسب المتضاعفة :

قانون ينص على تكوين مركبات مختلفة من اتحاد العناصر نفسها فإن النسبة بين كتل أحد العناصر التي تتحد مع كتلة ثابتة من عنصر آخر في هذه المركبات هي نسبة عددية صحيحة .

أمثلة/ الماء وفوق أكسيد الهيدروجين

الماء H_2O بينما فوق أكسيد الهيدروجين H_2O_2

فبالتالي ستكون النسبة هي 2:1

مركبات النحاس والكلور

كلوريد النحاس الأحادي CuCl_2 ، كلوريد النحاس الثنائي CuCl

ذلك فإن النسبة هي 2:1

الفصل الثالث: تركيب الذرة

الدرس (1-3) الأفكار القديمة للمادة

الفكرة الرئيسية: حاول الإغريق القدماء فهم المادة إلا أن الدراسة العلمية للذرة بدت مع جون دالتون في أوائل القرن التاسع عشر.

فلاسفة الإغريق : لقد جذب الفضول العلمي انتباه الكثير من المفكرين المعروفين بالفلسفه، الذين بحثوا في أسرار الحياة المتعددة، وعندما تسائل هؤلاء الفلسفه عن طبيعة المادة، وضع الكثير منهم تفسيرات قائمه على خبراتهم الشخصية، واستنتج الكثير منهم ان المواد مكونة من أشياء مثل التراب والماء والهواء والنار.

ديموقريطوس: أول من اقترح ان النواة ليست قابلة للتقسيم، واعتقد أن المادة مكونة من ذرات، واعتقد أن الذرة لا يمكن تحطيمها.

أرسطو: رفض فكرة الذرات، لأنه لم يكن يعتقد وجود فراغ. ولأنه كان ذو تأثير كبير فلذلك رفضت أفكار ديمقريطوس .

جون دالتون: أدت تجاربه إلى بداية تطور النظرية الذرية الحديثة، وأعادت إحياء أفكار ديمقريطوس ومراجعتها، وهناك تشابه من عدة وجوه بين أفكار دالتون وديموقريطوس.

وأدلت تجاربه العملية وأبحاثه إلى ما عرف بنظرية دالتون الذرية عام 1803 م .

قانون حفظ الكتلة : الكتلة ثابتة (محفوظة) في التفاعلات الكيميائية، أي أنها لا تنقص ولا تزيد ((إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى)) .

الجدول 1-3	
الأفكار	الفيلسوف
<ul style="list-style-type: none"> ت تكون المادة من ذرات تتحرك في الفراغ. الذرات صلبة، متجانسة، لا تفني ولا تتجزأ. الأنواع المختلفة من الذرات لها أحجام وأشكال مختلفة. حجم الذرات وشكلها وحركتها يحدد خواص المادة. 	 Democritus (460–370) ق.م
<ul style="list-style-type: none"> لا وجود للفراغ. المادة مكونة من التراب، والنار، والهواء، والماء. 	 Aristotle (384–322) ق.م

الجدول 2-3	
الأفكار	الفيلسوف
<ul style="list-style-type: none"> ت تكون المادة من أجزاء صغيرة جداً تسمى الذرات. الذرات لا تتجزأ ولا تفني. تشابه الذرات المكونة للعنصر في الحجم، والكتلة، والخواص الكيميائية. تحتختلف ذرات أي عنصر عن ذرات العناصر الأخرى. الذرات المختلفة تتحدد بنسبية عدديّة بسيطة لتكوين المركبات. في التفاعلات الكيميائية: تفصل الذرات، أو تتحدد، أو يعاد ترتيبها. 	 John Dalton (1766 – 1844) م

الدرس(2-3) تعريف الذرة

الفكرة الرئيسية : تتكون الذرة من بروتونات ونيوترونات وإلكترونات تدور حول النواة.

الذرة لا يمكن تجزئتها إلى أصغر منها بالطرق العادية .

الذرة أصغر جزء يحتفظ بخواص العنصر .

يمكنك رؤية الذرات بواسطة المجهر الأبوبي الماسح STM.

أنابيب أشعة المهبط هي أنابيب زجاجية مفرغة من الهواء يمرر فيها كهرباء.

الكاثود القطب الموصل بالطرف السالب للبطارية.

الأئنود القطب الموصل بالطرف الموجب الصاعد.

أشعة المهبط الشعاع الذي خرج من المهبط إلى المصعد وهي عبارة عن سيل من الجسيمات المشحونة وفيها شحنات سالبة . وقد تسببت في اختراع التلفاز.

الإلكترونات (اكتشفها طمسن) الجسيمات سالبة الشحنة موجودة في جميع أشكال المادة ويرمز لها ب(e^-) .

طمسن

استطاع طومسون تحديد نسبة شحنة جسيمات أشعة المهبط إلى كتلتها .

واستنتج أن كتلة الجسيم المشحون أقل من كتلة ذرة الهيدروجين، وأنه يمكن تجزئة الذرات إلى جسيمات أصغر .

وهو من اكتشف أول جسيم مكون للذرة وهو **الإلكترون**.

تجربة قطرة الزيت مليكان لحساب مقدار شحنة الإلكترون ،

وباستعمال مليkan لنسبة الشحنة إلى الكتلة تمكّن من حساب كتلة الإلكترون .

نموذج طمسن الذري

الذرة كروية الشكل مكونة من شحنات موجبة موزعة بانتظام ، مغروس فيها إلكترونات منفردة سالبة الشحنة .

الذرة متعدلة كهربائياً .

تجربة رذرفورد (نموذج رذرفورد الذري)

مشاهدات واستنتاجات رذرفورد من تجربته

الاستنتاجات	المشاهدات
استنتج أن معظم حجم الذرة فراغ .	معظم أشعة ألفا تمر دون أن تعاني أي انحراف في مسارها .
اصطدام بجزء صغير ذو كثافة عالية في مركز الذرة عرف بالنواة .	نسبة قليلة من جسيمات ألفا إنحرفت بزاوية كبيرة (ارتدت أو انعكست) .
لأن أشعة ألفا الموجبة مررت بجوار شحنة مشابهة لها وتنافرت معها وهي شحنة النواة الموجبة.	نسبة قليلة من جسيمات ألفا إنحرفت بزاوية صغيرة (مررت ثم انحرفت قليلاً عن مسارها) .

البروتونات (اكتشفها رذرفورد)

البروتونات يرمز لها ب(p) وهي جسيمات ذرية تحمل شحنة تساوي شحنة إلكترون ولكنها موجبة.

النيترونات (اكتشفها جيمس شادويك)

النيترونات وهي جسيم ذري كتلته قريبة من كتلة البروتون لكنه لا يحمل شحنة كهربائية (متعادل كهربائياً) ويرمز له ب(n) .

النموذج الذري الحديث

- الذرة كروية الشكل، تتكون من بروتون ونيترون وإلكترون .
- تحتوي على نواة صغيرة وكثيفة مكونة من شحنات موجبة محاطة بإلكترون أو أكثر.
- معظم حجم الذرة فراغ يحتوي على إلكترونات سريعة الحركة، وهي تتحرك في الفراغ المحيط بالنواة .

خواص الجسيمات المكونة للذرة

خواص الجسيمات المكونة للذرة					الجدول 3-3
الكتلة الحقيقية (g)	الكتلة النسبية	الشحنة الكهربائية النسبية	الموقع	الرمز	الجسيمات المكونة للذرة
9.11×10^{-28}	$\frac{1}{1840}$	-1	في الفراغ المحيط بالنواة	e^-	إلكترون
1.673×10^{-24}	1	+1	في النواة	p	بروتون
1.675×10^{-24}	1	صفر	في النواة	n	نيترون

الدرس(3-3) كيف تختلف الذرات؟

الفكرة الرئيسية يحدد عدد البروتونات والعدد الكتلي نوع الذرة.

العدد الذري هو عدد البروتونات في الذرة، ويكتب في أعلى رمز العنصر.

العدد الذري = عدد البروتونات = عدد الالكترونات

• أخطاء جون دالتون

- لا يمكنه تجزئة الذرة . - وأن ذرات العنصر الواحد متشابهة.

وذلك لأن ذرات العنصر بها نفس عدد البروتونات والإلكترونات إلا أن عدد النيوترونات يختلف.

النظائر هي ذرات لعنصر واحد لها نفس العدد الذري وتحتلت في عدد النيوترونات .

كتلة النظائر النظائر التي لها عدد أكبر من النيوترونات تكون كتلتها أكبر .

تحديد النظائر كل نظير من نظائر العنصر يعرف بعده الكتلي .

العدد الكتلي = العدد الذري + عدد النيوترونات

النظائر في الطبيعة توجد معظم العناصر في الطبيعة على هيئة مخاليط من النظائر.

وحدة الكتل الذرية (amu) (amu) التي تعرف بأنها (1\12) من كتلة الكربون-12 لذا فإن وحدة الكتل الذرية تقريباً تساوي كتلة نيوترون أو بروتون.

- لأن كتلة الذرة تعتمد أساساً على عدد البروتونات والنيوترونات، ولأن كل كتل البروتون والنيوترون قريب من 1amu، فقد تتوقع أن العدد الكتلي دائماً صحيحاً، ولكن هذا ليس صحيحاً .

الكتلة الذرية للعنصر هي متوسط كتل نظائر العنصر، لأن للنظائر كتلاً مختلفة فإن متوسط الكتلة الذرية ليس عدداً صحيحاً .

الدرس(3-4) الأنوية غير المستقرة والتحلل الإشعاعي

الفكرة الرئيسية: الذرات الغير مستقرة تصن در إشعاعات للوصول إلى حالة استقرار.

النشاط الإشعاعي المواد التي تصدر إشعاعات من خلال عملية


إشعاعات هي الأشعة والجسيمات المنبعثة من المواد المشعة،

التفاعل النووي التفاعل الذي يؤدي إلى تغير النواة.


التحلل الإشعاعي تفقد الأنوية غير المستقرة الطاقة بإصدار إشعاعات في عملية تلقائية.

تحلل الذرات غير المستقرة إشعاعياً، وتحول إلى ذرات مستقرة.

أشعة ألفا الأشعة التي انحرفت في اتجاه الصفيحة السالبة الشحنة، وهي مكونة من جسيمات ألفا، **جسيم ألفا** يحتوي على بروتونين ونيوترونين ، ويمثل بأيون ذرة الهيليوم He^{+2}



أشعة بيتا سميت أشعة بيتا التي انحرفت في اتجاه الصفيحة الموجبة الشحنة، وهي مكونة من جسيمات بيتا السريعة الحركة، **جسيم بيتا** عبارة عن الكترون له شحنة سالبة أحادية، ومصدر هذا الإلكترون هو النواة وليس السحابة الإلكترونية



أشعة جاما لها طاقة عالية وليس لها كتلة ويرمز اليها ب(γ)، ولأنها متعادلة الشحنة فإنها لا تتحرف في المجال المغناطيسي أو الكهربائي وتزافق عادة أشعة ألفا وبيتا، وهي مسؤولة عن معظم الطاقة التي تفقد خلال التحلل الإشعاعي .



أشعة جاما جسيم ألفا ثوريوم - 234 يورانيوم - 238

استقرار النواة

إن العامل الرئيس في تحديد استقرار الذرة هو نسبة النيوترونات إلى البروتونات .

خواص الإشعاعات

الجدول 5-3

الكتلة (amu)	الكتلة (kg)	الشحنة	الرمز	جاما	بيتا	الفا
				γ	e^- أو β	${}^4_2\text{He}$ أو α
$\frac{1}{1840}$				0		4
9.11×10^{-31}	6.65×10^{-27}			0		
				0	1-	2+

الفصل الرابع / التفاعلات الكيميائية

الدرس (4-1) التفاعلات و المعادلات

الفكرة الرئيسية: تمثل التفاعلات الكيميائية بمعادلات كيميائية موزونة .

التفاعل الكيميائي هي العملية التي يعاد فيها ترتيب الذرات في مادة أو أكثر لتكوين مواد مختلفة .

مؤشرات حدوث التفاعل الكيميائي

- تغير درجة الحرارة ، إطلاق طاقة على شكل ضوء وحرارة أو امتصاص حرارة .
- تغير اللون ، تصاعد الغاز ، تكون مادة صلبة .

مثال على مؤشر حدوث تفاعل

تحول لون الموز من الأخضر إلى الأصفر

التوزيع الإلكتروني: كل مستوى (n) من مستويات الطاقة الرئيسية يسع عدداً محدوداً من الإلكترونات.

أقصى عدد من الإلكترونات يستوعبه مستوى الطاقة الرئيس يمكن حسابه بالمعادلة: $e=2n^2$.
الإلكترونات تتوزع في مستويات طاقة ثانوية مختلفة الشكل والطاقة يشار إليها بالأحرف (f,d,p,s)

تتوزع الطاقة ضمن مستويات الطاقة الرئيسية في مستويات طاقة فرعية داخل مستويات الطاقة الثانوية بدءاً من الأقل طاقة.



من إستثناءات التوزيع الإلكتروني

Cu₂₉: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁹
 2 2 6 2 6 1 10

Cu₂₉: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s³ 3d⁴

Cr₂₄: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁴
 2 2 6 2 6 1 5

Cr₂₄: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s³ 3d¹

رموز الموز والصيغ

صيغ الأيونات عديدة الذرات وأعداد أكسدتها

الصيغة : مجموعة من الرموز للدلالة على المركب أو الأيون عديد الذرات (الشقوق)

صيغ الأيونات عديدة الذرات (الشقوق) (عدد أكسدتها)

صيغة الأيون	الاسم	صيغة الأيون	الاسم
IO_4^-	بيرايدات	NH_4^+	أمونيوم
CH_3COO^-	اسيتات	NO_2^-	نيترويت
H_2PO_4^-	فوسفات ثنائية الهيدروجين	NO_3^-	نترات
CO_3^{2-}	كربونات	OH^-	هيدروكسيد
SO_3^{2-}	كيربيتات	CN^-	سيانيد
SO_4^{2-}	كبريتات	MnO_4^-	برمنجنات
$\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	ثيوكابريلات	HCO_3^-	بيكربونات
O_2^{2-}	بيروكسید	ClO^-	هيبوكلورايت
CrO_4^{2-}	كرومات	ClO_2^-	كلورايت
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$	ثنائي كرومات	ClO_3^-	كلورات
HPO_4^{2-}	فوسفات هيدروجينية	ClO_4^-	بيركلورات
PO_4^{3-}	فوسفات	BrO_3^-	برومات
AsO_4^{3-}	زرنيخات	IO_3^-	أيودات

حمض الأسيتيك	حمض الفوسفوريك	حمض الكربونيك	حمض الكبريتيك	حمض النيتروز	حمض النترات	حمض البوتاسيك	أهم الأحماض
CH_3COOH	H_3PO_4	H_2SO_3	H_2SO_4	HNO_2	HNO_3	HCl	

رموز العناصر وعدد أكسدتها

الرمز : حرف أو حرفان مشتقان من اسم العنصر للدلالة عليه .

رموز بعض العناصر وعدد أكسدتها

العنصر	رمز العنصر	رمز الأيون	عدد الأكسدة	رمز الأيون	رمز العنصر	عدد الأكسدة
سكلاتنيوم	Sc	Sc^{+3}	3+	H	H	هيدروجين
منجنيز	Mn	$\text{Mn}^{+2}, \text{Mn}^{+3}$	3+, 2+	Li	Li	ليثيوم
حديد	Fe	$\text{Fe}^{+2}, \text{Fe}^{+3}$	3+, 2+	Na	Na	صوديوم
كوبالت	Co	$\text{Co}^{+2}, \text{Co}^{+3}$	3+, 2+	K	K	بوتاسيوم
nickel	Ni	Ni^{+2}	2+	Mg	Mg	مغنيسيوم
بلاتينيوم	Pt	$\text{Pt}^{+2}, \text{Pt}^{+4}$	2+, 4+	Ca	Ca	كالسيوم
نحاس	Cu	$\text{Cu}^{+}, \text{Cu}^{+2}$	1+, 2+	Ba	Ba	باريوم
فضة	Ag	Ag^{+}	1+	N	N	نيتروجين
ذهب	Au	$\text{Au}^{+}, \text{Au}^{+3}$	1+, 3+	P	P	فوسفور
خارчин	Zn	Zn^{+2}	2+	As	As	زرنيخ
كادميوم	Cd	Cd^{+2}	2+	O	O	أكسجين
زنبق	Hg	$\text{Hg}^{+}, \text{Hg}^{+2}$	1+, 2+	S	S	كربون
الومنيوم	Al	Al^{+3}	3+	F	F	فلور
جالبوم	Ga	$\text{Ga}^{+2}, \text{Ga}^{+3}$	2+, 3+	Cl	Cl	كلور
قصدير	Sn	$\text{Sn}^{+2}, \text{Sn}^{+4}$	2+, 4+	Br	Br	بروم
رصاص	Pb	$\text{Pb}^{+2}, \text{Pb}^{+4}$	2+, 4+	I	I	يود

جزيئات العناصر ثنائية الذرة

جزيئات العناصر ثنائية الذرة	يود	بروم	كلور	فلور	نيتروجين	أكسجين	هيدروجين
	I_2	Br_2	Cl_2	F_2	N_2	O_2	H_2

التوزيع الإلكتروني

ترتيب المستويات الإلكترونية ss ps ps dps dps fdps fdp

$1\text{s}^2 / 2\text{s}^2 2\text{p}^6 / 3\text{s}^2 3\text{p}^6 /$

$4\text{s}^2 3\text{d}^{10} 4\text{p}^6 / 5\text{s}^2 4\text{d}^{10} 5\text{p}^6 /$

$6\text{s}^2 4\text{f}^{14} 5\text{d}^{10} 6\text{p}^6 / 7\text{s}^2 5\text{f}^{14} 6\text{d}^{10} 7\text{p}^6$

المستويات الرئيسية : سبعة مستويات (1,2,3,4,5,6,7)

المستويات الثانوية : أربعة مستويات (s,p,d,f)

المستويات الفرعية: (عدد الغرف)

عدد الإلكترونات في المستويات الفرعية 14

كتابه الصيغ الكيميائية لكتابة الصيغ الكيميائية لابد أن تعرف أولاً عدد تأكسد (تكافؤ) العنصر.

عدد التأكسد: هو عدد الإلكترونات التي تفقدتها أو تكتسبها أو تشارك بها ذرة العنصر في أثناء التفاعل الكيميائي.

تسمية المركبات الأيونية هناك خطوات وقواعد للتسمية

خطوات تسمية المركبات الأيونية :

- ١- يسمى الأيون السالب أولاً متبوعاً باسم الأيون الموجب .
- ٢- في حالة الأيون السالب الأحادي الذرة يشتق الاسم من اسم العنصر مضافاً إليه المقطع(يد).
- ٣- عند وجود أكثر من عدد تأكسد لأيون الموجب يجب أن تشير إلى عدد التأكسد بالأرقام اللاتينية بعد اسم موجب ، أحادي (I) ، ثلثائي (II) ، رباعي (III) ، خماسي (IV) .
- ٤- عندما يحتوي المركب على أيون عديد الذرات نقوم بتنسيمه أولاً ثم نسمى الأيون الموجب .

أمثلة توضح كتابة صيغ المركبات الأيونية

وأكسيد الألومنيوم Al_2O_3 وكلوريد الكوبالت II CoCl_2 وهيدروكسيد الصوديوم NaOH مثال على ذلك: كلوريد الصوديوم NaCl ، وبروميد الصوديوم NaBr وكرومات الفضة Ag_2CrO_4 ونترات النحاس II $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ وأكسيد الحديد II . Fe_2O_3 وأكسيد الحديد III . Fe_3O_4

صيغ المركبات	أسماء المركبات
KNO_3	نترات البوتاسيوم
NaClO_4	بيركلورات الصوديوم
KMnO_4	برمنجنات البوتاسيوم
AgBr	بروميد الفضة
CuSO_4	كبريتات الكالسيوم


صيغ المركبات	أسماء المركبات
MgSO_3	كبريتيت المغنيسيوم
Al(OH)_3	هيدروكسيد الألミニوم
$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	كبريتات الأمونيوم
HCN	سيانيد الهيدروجين
FePO_4	فوسفات الحديد III

المتفاعلات : وهي المواد التي توجد عند بداية التفاعل .


النواتج : وهي المواد المكونة خلال التفاعل .

تستخدم الرموز في المعادلات لتوضيح الحالة الفيزيائية لكل مادة متفاعلة أو ناتجة.
(s) يشير إلى الحالة الصلبة ، (I) يشير إلى الحالة السائلة .
(g) يشير إلى الحالة الغازية ، (aq) يشير إلى محلول المائي .

المعادلات الكيميائية اللفظية: يمكنك استعمال المعادلات اللفظية للتعبير عن كل من المواد المتفاعلة و الناتجة في التفاعلات الكيميائية



المعادلات الكيميائية الرمزية: تستخدم رموز العناصر وصيغ المركبات في المعادلات الكيميائية الرمزية للتعبير عن المتفاعلات و النواتج



المعادلات الكيميائية الرمزية الموزونة: تشبه المعادلات الرمزية المعادلات اللفظية في أنها تفتقر إلى معلومات مهمة عن التفاعلات.

$$4\text{Al}_{(s)} + 3\text{Br}_2(l) \rightarrow 2\text{AlBr}_3$$

ـ "قانون حفظ الكتلة":

- ينص على أنه خلال التغير الكيميائي لا تفنى المادة ولا تستحدث.
- لتمثيل التفاعل الكيميائي بمعادلة صحيحة أستخدم (المعادلة الكيميائية الرمزية الموزونة) **المعادلات الكيميائية الرمزية الموزونة :** تعبر يستخدم الصيغ الكيميائية لتوضيح أنواع المواد المتضمنة في التفاعل الكيميائي وكميياتها النسبية .

ـ وزن المعادلات الكيميائية

- لكي تزن المعادلات الكيميائية يجب أن تجد المعاملات الصحيحة للصيغ الكيميائية في المعادلة الرمزية.

المعامل : في المعادلة الكيميائية هو العدد الذي يكتب قبل المادة المتفاعلة أو الناتجة.

- تصف المعاملات في المعادلة الموزونة أبسط نسبة عددية صحيحة لكميات كل من المتفاعلات والنواتج.

تحقيق قانون حفظ الكتلة : قانون حفظ الكتلة من أهم المفاهيم الأساسية في الكيمياء ، ويتم تطبيقه في المعادلة الكيميائية بوزنها .

قانون حفظ الكتلة : ينص على أن المادة لا تفنى ولا تستحدث إلا بقدرة الله تعالى.

الدرس(4-2) تصنیف التفاعلات الكیمیائیة

الفكرة الرئيسية: هناك أربعة أنواع من التفاعلات الكيمیائية هي: التكوين ، والإحتراق ، والتفکك ، والإحلال .




أنواع التفاعلات الكيمیائية

التكوين - الإحتراق - التفكك - الإحلال بنوعيه البسيط والمزدوج





تفاعلات التكوين

تفاعل التكوين: تفاعل كيمیائي تتحد فيه مادتان أو أكثر لتكوين مادة واحدة ، ويمكن تمثيله بالمعادلة الآتية:



تفاعلات الاحتراق

تفاعل الاحتراق : يتحد الأكسجين مع مادة كيمیائية مطلقاً طاقة على شكل حرارة وضوء



ليست كل تفاعلات الاحتراق تفاعلات تكوين




يحرق الميثان هو المكون الرئيسي للغاز الطبيعي، وينتمي إلى مجموعة من المركبات تسمى الهيدروكربونات وهي المكون الرئيسي للنفط الذي هو مصدر مهم للطاقة .



٤ تفاعلات التفكك

تفاعل التفكك: هو تفاعل يتفكك فيه مركب واحد لإنتاج عنصرین أو أكثر أو مركبات جديدة.

تفاعلات التفكك هي عكس تفاعلات التكوين



يستخدم هذا التفاعل في السيارات في نفح أكياس الهواء (أكياس السلامة).

٥ تفاعلات الإحلال

٦ تفاعل الإحلال البسيط




تفاعل الإحلال البسيط : التفاعل الذي تحل فيه ذرات عنصر محل ذرات عنصر آخر في مركب

- **الفلز يحل محل الهيدروجين أو فلز آخر حسب سلسلة النشاط الكيميائي**



لأن الفضة تقع بعد النحاس في سلسلة النشاط الكيميائي ولهذا لا يحدث تفاعل:





- **اللافلز يحل محل اللافلز:**




الشكل ١٥-٤ سلسلة النشاط الكيميائي كالمبنية هنا للفلزات والهالوجينات هي أداة مفيدة في تحديد إمكانية حدوث تفاعل كيميائي، وتحديد نطاق تفاعلات الإحلال البسيط.

٤ تفاعلات الإحلال المزدوج



الشكل ٤-٤ تبادل الأيونات أماكنها في تفاعلات الإحلال المزدوج كما في تفاعل هيدروكسيد الكالسيوم وحمض الهيدروكلوريك.

تفاعل الإحلال المزدوج: يسمى التفاعل الذي يتم فيه تبادل الأيونات بين مركبين تفاعل الإحلال المزدوج .



تسمى المادة الصلبة التي تنتج خلال تفاعل كيميائي في محلول ما راسباً.

نواتج تفاعلات الإحلال المزدوج إحدى المميزات الأساسية لتفاعلات الإحلال المزدوج هي نوع الناتج المتكون عندما يحدث التفاعل ، فهي إما تنتج ماءً ، أو راسباً ، أو غازاً .

الدرس(4-3) التفاعلات في المحاليل المائية

الفكرة الرئيسية: تحدث تفاعلات الإحلال المزدوج بين المواد في المحاليل المائية وتؤدي إلى إنتاج رواسب أو ماء أو غازات.

المحلول المائي يحتوي على مذيب ومذاب .


المذاب مادة أو أكثر مذابة في الماء. المذيب أكبر مكونات محلول .

ـ المركبات الجزيئية في محلول

ـ الماء هو المذيب في المحاليل المائية دائمًا.

ـ فالسكروز والإيثانول هما مركبان يذوبان في محلول في صورة جزيئات وهناك مواد جزيئية (تساهمية) تكون أيونات عندما تذوب في الماء .

ـ فالمركب الجزيئي كلوريد الهيدروجين مثلاً يكون أيونات الهيدروجين وأيونات الكلوريد عندما يذوب في الماء .



ـ محلول كلوريد الهيدروجين المائي يُسمى حمض الهيدروكلوريك . $\text{HCl}_{(\text{aq})}$.

ـ المركبات الأيونية في محلول تتكون المركبات الأيونية من أيونات موجبة وأيونات سالبة مرتبطة معًا بروابط أيونية.

ـ عندما تذوب المركبات الأيونية في الماء فإن أيوناتها تنفصل بعضها عن بعض وتسمى هذه العملية التفكك. فالمحلول المائي لكلوريد الصوديوم يحتوي على أيونات Cl^- و Na^+ .

ـ عند دمج محلولين مائيين يحويان مواد ذائبة فإن الأيونات قد يتفاعل بعضها مع بعض وكثير من هذه التفاعلات تفاعلات إحلال مزدوج . ويمكن أن تؤدي إلى ثلاثة أنواع من النواتج هي: راسب ، أو ماء ، أو غاز.

المعادلة الأيونية الكاملة: هي المعادلة التي تبين الجسيمات في محلول .


الأيونات المتفرجة : هي التي لم تشارك في التفاعل عند شطب هذه الأيونات من طرفي المعادلة الأيونية تحصل على ما يسمى المعادلة الأيونية النهائية .

ـ التفاعلات التي تكون رواسب:




مثال: المعادلة الرمزية



المعادلة الأيونية الكاملة :



المعادلة الأيونية النهائية :






التفاعلات التي تكون ماء: هذا النوع من تفاعلات الإحلال المزدوج يؤدي إلى تكوين جزيئات الماء.



التفاعلات التي تكون غازات: هذا النوع من تفاعلات الإحلال المزدوج يؤدي إلى تكوين غازات.

مثل: CO_2 و H_2S



● من التفاعلات التي تنتج غاز تفاعل الأحماض مع الكربونات أو البيكربونات لينتاج غاز ثاني أكسيد الكربون CO_2 ويكون كذلك الماء H_2O والملح.

الخلاصة

- الماء هو المذيب في المحاليل المائية دائمًا.
- بعض المركبات الجزيئية تكون أيونات عندما تذوب في الماء بينما يذوب كثير من المركبات الأيونية في الماء وتتفصل أيوناتها.
- عند مزج محلولين يحتويان على أيونات ذاتية، قد تتفاعل الأيونات معًا، أما جزيئات المذيب فلا تتفاعل عادة.
- التفاعلات التي تحدث في المحاليل المائية هي تفاعلات الإحلال المزدوج.

الفصل الخامس / المول

الدرس (5-1) / قياس المادة

الفكرة الرئيسية: يستعمل الكيميائيون المول لعد الجسيمات ومنها الذرات والأيونات والجزئيات ووحدات الصيغ الكيميائية.

عدد الجسيمات

المول هو وحدة النظام الدولي الأساسية المستخدمة لقياس كمية المادة.

● يعرف المول بحسب النظام الدولي للوحدات بأنه عدد ذرات الكربون -12 في عينة كتلتها 12g من الكربون -12.


● 6.02×10^{23} من الجسيمات المماثلة ومنها الذرات والأيونات والجزئيات ووحدات الصيغ الكيميائية.

● يسمى العدد 6.02×10^{23} عدد أفوجادرو تكريماً للفيزيائي الإيطالي والمحامي أميدو أفوجادرو.

● عدد أفوجادرو عدد هائل ، وهذا ما يجعله صالحًا لعد المكونات المتناهية في الصغر مثل الذرات والأيونات والجزئيات ووحدات الصيغة .

تحويل المولات إلى جسيمات

يتم تحويل المولات إلى جسيمات عن طريق ضرب عدد أفوجادرو في عدد المولات.



تحويل الجسيمات إلى مولات

يتم تحويل الجسيمات إلى مولات عن طريق قسمة عدد الجسيمات على عدد أفوجادرو.

$$\frac{1 \text{ mol}}{6.02 \times 10^{23}} \quad \text{عدد المولات} = \text{عدد الجسيمات} \times$$

الدرس (2-5) الكتلة و المول


الفكرة الرئيسية: يحتوي المول على العدد نفسه من الجسيمات دائماً ، غير أن مولات المواد المختلفة لها كتل مختلفة.

الكتلة المولية

أن المول يعرف على أنه عدد ذرات الكربون-12 في 12g منه.

الكتلة المولية : هي الكتلة بالجرامات لمول واحد من أي مادة ندية ،

الكتلة المولية $\text{amu} = \frac{\text{كتلة المولية}}{\text{كتلة الذرية}}$



استخدام الكتلة المولية

تحويل المولات إلى كتلة

يتم بضرب عدد المولات في الكتلة المولية.

$$\text{الكتلة بالجرامات (g)} = \frac{\text{الكتلة المولية (g)}}{1 \text{ mol}} \times \text{عدد المولات (mol)}$$

تحويل الكتلة إلى المولات

يتم بضرب الكتلة بالجرام في مقلوب الكتلة المولية .

$$\text{عدد المولات (mol)} = \frac{1 \text{ mol}}{\text{الكتلة المولية (g)}} \times \text{الكتلة بالجرامات (g)}$$

التحويل من الكتلة إلى عدد الجسيمات

يتم بقسمة الكتلة على الكتلة المولية ليعطينا عدد المولات ثم نضرب عدد المولات في عدد أفوجادرو ليعطينا عدد جسيمات هذا العنصر .

التحويل من الكتلة إلى عدد الجسيمات

المول هو الأساس ،

يتم تحويل الكتلة إلى مولات أولاً ثم تحويلها إلى جسيمات وتدمج الخطوتين في العلاقة التالية :



$$\text{عدد الجسيمات} = \frac{\text{الكتلة بالجرامات}}{\text{الكتلة المولية}} \times \text{عدد أفوجادرو}$$

التحويل من عدد الجسيمات إلى الكتلة

المول هو الأساس ،

يتم تحويل عدد الجسيمات إلى مولات ثم تحويلها إلى كتلة وتدمج الخطوتين في العلاقة التالية :

$$\text{الكتلة بالграмм} = \frac{\text{عدد الجسيمات}}{\text{عدد أفوجادرو}} \times \text{الكتلة المولية}$$



الدرس (3-5) مولات المركبات

الفكرة الرئيسية: يمكن حساب الكتلة المولية للمركب من خلال صيغته الكيميائية ، كما يمكن استعمال هذه الكتلة المولية للتحويل بين الكتلة والمولات للمركب نفسه.

الكتلة المولية للمركبات

الكتلة المولية للمركب قانون حفظ الكتلة؛ فالكتلة الكلية للمتفاعلات = كتلة المركب المتكون.

تحويل كتلة المركب إلى مولات والعكس

يتم بقسمة الكتلة بالجرام للمركب على الكتلة المولية.

الكتلة المولية و مقلوبها هما عامل التحويل بين الكتلة و عدد المولات ،

$$\text{الكتلة بالجرامات} = \frac{\text{عدد المولات (mol)}}{1 \text{ mol}} \times \text{الكتلة المولية (g)}$$

$$\text{عدد المولات} = \frac{1 \text{ mol}}{\text{الكتلة المولية (g)}} \times \text{الكتلة بالجرامات (g)}$$

تحويل كتلة المركب إلى عدد جسيمات والعكس

يتم بقسمة الكتلة بالجرام على الكتلة المولية للمركب ليعطينا عدد المولات للمركب ثم نضرب عدد المولات في عدد أفوجادرو ليعطينا عدد جسيمات هذا المركب.

إن عدد أفوجادرو و مقلوبه هما عامل التحويل بين عدد الجسيمات والمولات . ولتحديد أعداد الذرات والآيونات في المركب فذلك يعتمد على الصيغة الكيميائية .

$$\text{عدد الجسيمات} = \frac{\text{الكتلة بالجرامات}}{\text{الكتلة المولية}} \times \text{عدد أفوجادرو}$$

$$\text{الكتلة بالجرام} = \frac{\text{عدد الجسيمات}}{\text{عدد أفوجادرو}} \times \text{الكتلة المولية}$$